



## BLOC EXTRUDE DIFENACOUM FICHE TECHNIQUE

GAMME  
PRO.

### DESCRIPTIF PRODUIT

Matière active : **Difénacoum 0,005 %**  
Contient un agent amérisant (0,01%)  
**A.M.M FR-2014-0063 - «DIFAPAQ 50»**



Support :	Bloc hydrofuge extrudé
Couleur :	Bleu
Cibles	Rat et souris
Usages autorisés :	Professionnels 3D certifiés
Lieu d'utilisation :	interieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles

**Réf. RA618 :** **Seau de 5 kg** (bloc de 20g nu)  
**Réf. RA910 :** **Carton de 10 Kg** (bloc de 40g emballé)

### INFORMATIONS COMMERCIALES

Appât prêt à l'emploi pour un usage polyvalent contre les rats et souris. Process de fabrication extrudé pour une très bonne appétence. Forme étudiée pour favoriser la consommation (plusieurs angles d'attaque).

Appât à base de Difénacoum :

- Efficace par ingestion unique ou consommations répétées.
- Très bonne résistance à l'humidité.
- Antidote disponible (vitamine K1 sous contrôle médical).

Non détecté par les rongeurs, l'agent d'amertume (Benzoate de Denatonium) prévient les risques d'absorption accidentelle par l'homme.

Les rongeurs meurent quelques jours après consommation, ce qui n'éveille donc pas la méfiance de leurs congénères.

### TOXICOLOGIE

Non classé

**INDICATIONS POUR LE MEDECIN :** contient un rodenticide anticoagulant, un traitement à la vitamine K1 devrait être nécessaire pendant une longue période. **Centres antipoison :** INRS 01 45 42 59 59

### MÉTHODE D'APPLICATION

**Le produit ne doit être utilisé que dans des boîtes d'appât sécurisées étiquetées** ou dans d'autres stations d'appâts couvertes assurant le même niveau de protection. Les postes doivent être placés de manière sûre pour minimiser les risques d'accès au produit et d'ingestion par des enfants ou des animaux non cibles.

Identifier au préalable le rongeur, le comportement diffère selon l'espèce ciblée. Si possible, éliminer toute source de compétition alimentaire sur le site. Par mesure de sécurité, il est recommandé de ramasser les rongeurs morts afin qu'ils ne soient pas consommés par d'autres animaux (risques d'intoxication secondaire).

Doses d'utilisation :

Contre les rats : 60 à 100g tous les 5 à 10 mètres :  
contre les souris : 40g tous les mètres tous les 1 à 2 mètres.  
Adapter la dose ou le nombre de sachets préconisés par poste d'appâtage à la dose efficace recommandée.

Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site du traitement, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Les postes doivent être placés le long des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés.

**UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.**  
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Page 1 sur 1  
Mise à jour le 20.03.15

FDS disponible sur [www.aedes.fr](http://www.aedes.fr)