



BLÉ ENTIER BROMADIOLONE

FICHE TECHNIQUE

GAMME
PRO.



DESRIPTIF PRODUIT

Matière active : **Bromadiolone 0,005 %**
Contient un agent amérisant (0,001%)
A.M.M FR-2014-0020 - «FAAR BLE»

Support :	Blé entier
Couleur :	Rouge
Cibles	Rats
Usages autorisés :	Professionnels 3D certifiés
Lieu d'utilisation :	interieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles

Réf. RA848 : Sac de 10 Kg (vrac)

INFORMATIONS COMMERCIALES

Appât prêt à l'emploi pour un usage contre les rats.

Appât à base de Bromadiolone :

- Efficace par ingestion unique
- Pas de méfiance des rongeurs à l'égard de l'appât.
- Antidote disponible (vitamine K1 sous contrôle médical).

Non détecté par les rongeurs, l'agent d'amertume (Benzoate de Denatonium) prévient les risques d'absorption accidentelle par l'homme.

Les rongeurs meurent quelques jours après consommation, ce qui n'éveille donc pas la méfiance de leurs congénères.

Les rongeurs consomment peu de nourriture sur le même poste, aussi faut-il les multiplier pour accroître les chances de succès.

TOXICOLOGIE

Indication pour le médecin : FAAR BLE contient un rodenticide anticoagulant, un traitement à la vitamine K1 devrait être nécessaire pendant une longue période.

Centre antipoison : INRS 01 45 42 59 59



DANGER

MÉTHODE D'APPLICATION

Le produit ne doit être utilisé que dans des boîtes d'appât sécurisées étiquetées ou dans d'autres stations d'appâts couvertes assurant le même niveau de protection. Les postes doivent être placés de manière sûre pour minimiser les risques d'accès au produit et d'ingestion par des enfants ou des animaux non cibles.

Identifier au préalable le rongeur, le comportement diffère selon l'espèce ciblée. Si possible, éliminer toute source de compétition alimentaire sur le site. Par mesure de sécurité, il est recommandé de ramasser les rongeurs morts afin qu'ils ne soient pas consommés par d'autres animaux (risques d'intoxication secondaire).

Doses d'utilisation :

Contre les rats : 60 à 100g tous les 5 à 10 mètres : Adapter la dose ou le nombre de sachets préconisés par poste d'appâtage à la dose efficace recommandée.

Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site du traitement, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Les postes doivent être placés le long des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés.

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Page 1 sur 1
Mise à jour le 19.02.18

FDS disponible sur www.aedes.fr